



# Protégez votre corps Portez une combinaison !

## Quand la porter ?



### PORTEZ UNE COMBINAISON

Lors de tout risque d'exposition aux produits phytopharmaceutiques :

- Ouverture produit
- Préparation bouillie\*
- Intervention sur le pulvérisateur en cours de traitement
- Nettoyage du matériel et du pulvérisateur\*
- Pesée\*
- Application



### PESÉE & PRÉPARATION

Plus de 65 % des expositions interviennent lors de la préparation de la bouillie via le corps. Protégez-le !

A ce stade, une attention particulière est demandée, car le produit phytopharmaceutique est concentré.



### APPLICATION

Portez une combinaison si le pulvérisateur est sans cabine, si le traitement est réalisé à l'atomiseur, au pulvérisateur pneumatique ou à l'aide d'une lance. Dans le cas d'un pulvérisateur avec cabine fermée et filtre à charbon actif, il est recommandé d'ôter la combinaison pour rentrer dans la cabine. Elle doit être gardée à proximité pour une intervention sur le pulvérisateur ou sur la culture traitée (idéalement dans une caisse à l'extérieur de la cabine du tracteur).



### NETTOYAGE

Le nettoyage requiert également une attention particulière. Les projections sont nombreuses. Veillez à ce que la combinaison recouvre les bottes et que vos avant-bras soient bien protégés !



### LAVEZ UNE COMBINAISON

Lavez immédiatement toute partie de la combinaison souillée par le produit phytopharmaceutique. Lavez-vous les mains gantées ainsi que les avant-bras à la fin de chaque travail (préparation, remplissage, pulvérisation...).

\* Pour cette phase, portez en plus un écran facial et un tablier de protection sur la combinaison.

## Comment la choisir, la porter ?



Choisir sa combinaison selon l'exposition de l'opérateur et le classement du produit phytopharmaceutique. Vérifiez les vêtements avant toute utilisation, afin de détecter toute usure ou déchirure éventuelle. Lire la notice d'instruction de l'équipement de protection individuel et vérifier la date de péremption, si elle est précisée.



Il est recommandé de porter des vêtements à manches longues sous la combinaison. Enfilez votre combinaison. Chaussez les bottes en veillant à ce que les jambes de la combinaison recouvrent les bottes. Mettez vos protections des yeux et de la face. Remontez la capuche. Enfilez les gants par-dessus la combinaison s'il sont de plus de 35 cm de long sinon portez-les par-dessous.

## Comment l'enlever, la stocker ou l'éliminer ?



Se déshabiller dans un endroit propre (vestiaire). Rincez à l'eau claire les gants, la combinaison, l'écran facial éventuel et les bottes sur l'aire de lavage.



Les combinaisons sans souillure et sans altération seront stockées sur un cintre à l'abri de la lumière dans un endroit propre et sec (hors local phytopharmaceutique et à part des vêtements civils et des E.P.I. neufs). Les combinaisons défectueuses ou endommagées seront stockées dans le local phytopharmaceutique puis éliminées par une filière spécialisée. Les combinaisons neuves seront conservées à l'abri de la lumière et dans un endroit propre et sec (hors local phytopharmaceutique).



Prendre une douche après chaque utilisation de produits phytopharmaceutiques. Ne pas fumer, boire, téléphoner ou manger pendant le traitement. Ne jamais laver les vêtements souillés avec les vêtements familiaux.



Bayer CropScience